PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C12N 15/87, C07K 14/02, C12N 15/36, 15/86, A61K 48/00, 47/48

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 95/06745

A1

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

9. März 1995 (09.03.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE94/01003

(22) Internationales Anmeldedatum: 24. August 1994 (24.08.94)

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(30) Prioritätsdaten:

P 43 29 811.7 P 43 39 922.3 3. September 1993 (03.09.93) DE 19. November 1993 (19.11.93) DE Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (71) Anmelder: MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Hofgartenstrasse 2, D-80539 München (DE).
- (72) Erfinder: STRAUSS, Michael; Parkstrasse 3, D-13187 Berlin (DE). SANDIG, Volker; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE). HOFMANN, Christian; Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).
- (74) Anwalt: BAUMBACH, Fritz; BioTeZ Berlin-Buch GmbH, Patentstelle, Robert-Rössle-Strasse 10, D-13125 Berlin (DE).
- (54) Title: VECTOR FOR GENE THERAPY OF THE LIVER
- (54) Bezeichnung: VEKTOR FÜR LEBER-GENTHERAPIE

(57) Abstract

A liver-specific, gene therapy vector finds applications in medicine and genetic engineering. The object of the invention is to develop a vector that finds liver cells with high specificity, is effectively absorbed by the cells and may inject the imported therapeutic genes into the cell nucleus. The vector should be suitable for the gene therapy of human beings. The vector according to the invention is characterised in that a therapeutic gene coupled to a promoter is packed in a polypeptide sheath and coupled to components of hepatitis B virus.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Vektor für die leberspezifische Gentherapie; Anwendungsgebiete sind die Medizin und die Gentechnik. Ziel der Erfindung ist die Konstruktion eines Vektors, der Leberzellen hochspezifisch findet, von den Zellen effektiv aufgenommen wird und eingebrachte therapeutische Gene in den Zellkern einschleusen kann. Der Vektor soll für die Gentherapie beim Menschen einsetzbar sein. Der erfindungsgemäße Vektor ist dadurch gekennzeichnet, daß ein therapeutisches, an einem Promotor gekoppeltes Gen mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis-B-Virus gekoppelt wird.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

	= · · · ·				
AT AU BB BE BF BG BJ CA CF CG CN CN CS DE BS FR	Österreich Anstralien Barbados Belgien Burkina Paso Bulgarien Benin Brasilien Belatus Kanada Zemrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Côte d'Ivoire Kamerun China Tschechoslowakei Tschechische Republik Deuschland Dänemark Spanien Finnland Prankreich	GA GB GE GN GR HU IE IT JP KE KG KP KR LU LV MC MD MG MIL MN	Gabon Vereinigtes Königreich Georgien Guinea Griechenland Ungarn Iriand Italien Japan Kenya Kirgisistan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Rasachstan Liechtenstein Sri Lanka Luxemburg Lettland Monaco Republik Moldan Madagaskar Mali Mongolei	MR MW NE NL NO NZ PL PT RO RU SD SE SI SK STD TG TJ TJ TJ TJ TJ UA US UZ VN	Mainetaniea Malawi Niger Niederlande Norwegen Neusecland Poten Portugal Rumänien Russische Föderation Sudan Schweden Sloweniea Slowahrei Senegal Tachad Togo Tadschikistan Trinidad und Tobago Ukraine Vereinigte Staaten von Amerika Usbekistan

Vektor für Leber-Gentherapie

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Vektor für die leberspezifische Gentherapie; Anwendungsgebiete sind die Medizin und die Gentechnik.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Methoden und Vektoren für die Gentherapie entwickelt worden (Übersicht in Mulligan /1993/ Science 260, 926). Dabei werden viele Vektoren, vor allem solche, die von Retroviren oder Adenoviren abgeleitet sind, favorisiert. Beide Virus-Vektortypen sind relativ breit anwendbar, wobei retrovirale Vektoren nur bei teilungsfähigen Zellen effektiv sind und Adenoviren auch bei ruhenden Zellen funktionieren. Beide Vektortypen sind zwar für die Genübertragung in Leberzellen (Hepatozyten) in vitro geeignet, können aber für eine in vivo Anwendung zur Gentherapie beim Menschen kaum in Betracht gezogen werden. Während für die Anwendung retroviraler Vektoren eine Leberteilresektion zur Stimulierung von Zellteilung (Regeneration) erforderlich wird, ist der adenovirale Gentransfer nicht sehr stabil (keine Integration in das Genom).

Alternative Vektoren mit potentieller Anwendbarkeit für den Lebergentransfer basieren auf Liposomen oder auch auf Multikomponenten-Partikeln mit Proteindomänen, die spezifisch an bestimmte Rezeptoren der Leber (z.B. Asialoglykoprotein-Rezeptor) binden und durch deren Internalisierung in die Zelle aufgenommen werden können (Übersicht in: Versland et al /1992/Seminors in Liver Disease 12, 332). Ein wesentlicher Nachteil dieser Vektoren besteht in der Aufnahme über den endozytokischen Weg, der zu einer Degration eines großen Teils der Vektoren und ihrer DNA in den Endosomen führt, so daß nur wenig funktionsfähige DNA den Zellkern erreichen kann.

Eine Lösung für dieses Problem wurde zwar für die in vitro Anwendung gefunden; diese ist aber nicht auf die Situation in vivo (am Patienten) anwendbar. Sie basiert auf der gleichzeitigen Infektion der Zielzellen mit Adenovirus, was zur Auflösung der Endosomen und Freisetzung von Vektor (DNA) führt. (Curiel, D.T., Agrawal, S., Wagner, E. und Cotten, M. 1991, PNAS 88, 8850-8854).

Ziel der Erfindung ist die Konstruktion eines Vektors, der Leberzellen in vivo hochspezifisch findet, von den Zellen effektiv aufgenommen wird und eingebrachte therapeutische Gene in den Zellkern einschleusen kann. Der Vektor soll für die Gentherapie beim Menschen einsetzbar sein.

Die Erfindung wird gemäß Anspruch 1 realisiert, die Unteransprüche 2 - 9 sind Vorzugsvarianten.

Erfindungsgemäß wird ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, in eine Polypeptidhülle verpackt und mit Proteindomänen des HBV chemisch, enzymatisch oder über Antikörper gekoppelt. Als therapeutisches Gen wird die cDNA eines Gens verwendet, das bei der zu behandelten Krankheit defekt ist, d. h. fehlt oder durch Mutation verändert ist.

Beispiele für solche Gene sind das LDL-Rezeptor-Gen, dessen Fehlen die häufigste Stoffwechselerkrankung der Leber, die familiäre Hypercholesterinämie, verursacht, und das Alpha-1-Antitrypsin-Gen.

Als Promotoren dienen leberspezifische Promotoren, bevorzugt Promoter/Enhancer des Hepatitis-B-Virus wie z.B. die Kombinationen core-Promoter/ enhancer II. Sie sind neben ihrer Spezifität auch klein genug, um leicht in einen Expressionsvektor eingebaut werden zu können. Auch in Betracht für die Konstruktion des erfindungsgemäßen Vektors kommen Promotoren leberspezifischer Gene wie Albumin, PEPCK (Phosphoenolpyruvat-carboxykinase) oder OTC (Ornithintranscarbamylase).

Die für die Verpackung verwendete Polypeptidhülle besteht vorzugsweise aus chromosomalem Protein wie z. B. gereinigtem HMG1. Gleichermaßen geeignet sind auch andere DNA-bindende Proteine wie z. B. Protamine oder Hepatitis-core-Protein. Dieses Protein ist deshalb besonders geeignet, weil es außer seiner DNA-Bindungs- und DNA-Kondensationsfähigkeit eine natürliche Komponente des Hepatitis-B-Virus ist und deshalb den Einbau in Virushüllen begünstigt.

Die Polypeptidhülle kann gemäß der Erfindung auch aus Polyaminosäuren eines Typs basischer Aminosäuren hergestellt werden, wobei sich in erster Linie Poly-L-Lysin und Poly-L-Ornithin eignen.

2

Das erfindungsgemäß als gekoppelte Komponente eingesetzte partikuläre prä-S1/S-Protein des Hepatitis-B-Virus kann aus Virus-produzierenden Zellen isoliert werden. Prä-S1/S-Protein wird aber aus Sicherheitsgründen vorteilhafterweise gentechnisch hergestellt. Derartige Nukleinsäure-freie Partikel stellen von der äußeren Oberfläche gesehen eine vollständige Virushülle dar. Damit hat der resultierende Vektor eine hohe Homologie zum natürlichen Hepatitis-B-Virus und kann deshalb den Infektionsmechanismus nachvollziehen.

Anstelle der Verwendung der kompletten Virushüllproteine läßt sich die Erfindung auch mit Liposomen als Transportvehikeln realisieren. Dabei wird die Oberfläche der verwendeten Liposomen durch prä-S1/S-Protein so modifiziert, daß eine Aufnahme über Hepatitis-B-spezifischen Mechanismen möglich ist.

Die Herstellung der Vektoren erfolgt gemäß Anspruch 10, die Unteransprüche 11 - 13 sind Vorzugsvarianten. Ein vorteilhaftes Verfahren besteht z.B. darin, daß die Kopplung des in HMG1 verpackten Gens an prä-S/S1-Proteine des HBV kovalent mittels Transglutaminase-Reaktion erfolgt.

Der erfindungsgemäße Vektor ermöglicht, ein gewünschtes Gen in das Gewebe, insbesondere die Leber eines Patienten einzuführen und seinen Weg zum Funktionsort optimal zu gestalten. Das erfolgt beispielsweise dadurch, daß der Vektor konfektioniert und einem Patienten über die Blutbahn, vorzugsweise über die Portalvene der Leber, verabreicht wird. Mit der Erfindung wird eine wesentliche Voraussetzung für eine Therapie genetischer Erkrankungen der Leber geschaffen.

Die Erfindung soll nachfolgend durch ein Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

Anwendungsbeispiel

1. Expression von HBV-Hüllproteinen in Insektenzellen

Die Hülle des HBV-Virus besteht aus drei Proteinen. Sie sind Translationsprodukte eines offenen Leserahmens im HBV-Genom'mit unterschiedlichen Initiationsstellen. Während das große Hüllprotein (L: P39, GP42) die Domänen Prä-S1, Prä-S2 und S enthält, besteht das mittlere (M: P33, GP36) aus Prä-S2 und S und das kleine Hüllprotein (S: P24, GP27) nur aus der Domäne S.

Die Gene des kleinen (S) und großen (L) HBV-Hüllproteins werden durch Amplifikation aus dem Genom des Hepatitis B Virus (Subtyp ayw) gewonnen. Für das L-Gen werden verschiedene Varianten erstellt, um die Sekretion des Proteins zu erleichtern. Sie kodieren für ein N-terminal verkürztes L-Protein (Deletion der Aminosäuren 1-6), ein L-Protein, dessen Myristilierungsort mutiert wird (Aminosäure 2 Gly-->Ala) bzw. eine Fusion mit der Mellitin-Signalsequenz.

Alle Gene werden einzeln in den Baculovirus-Transfervektor PVL941 (Pharmingen) kloniert und stehen unter Kontrolle des Polyhedrin-Promoters. Nachträglich wird ein DNA-Fragment, bestehend aus dem Polyhedrin-Promoter und dem S-Gen in alle Vektoren, die Varianten des L-Gens enthalten, derart eingefügt, daß beide Expressionseinheiten in gleicher Orientierung vorliegen und von Baculovirus-Sequenzen flankiert sind.

Die rekombinanten Plasmide und Baculovirus-DNA (BaculoGold, Pharmingen) werden mit Lipofectin in Spodoptera frugiperda-Zellen (Sf9) kotransfiziert. Durch homologe Rekombination zwischen Plasmid und Virus-DNA werden rekombinante Baculoviren erzeugt, welche die HBV-Hüllproteine unter Kontrolle des Polyhedrinpromoters in infizierten Sf9-Zellen expremieren. Die Synthese dieser Proteine wird im Westernblot nachgewiesen. Elektronenmikroskopisch wird gezeigt, daß die Hüllproteine zu Partikeln assoziieren.

Nach wiederholter Passagierung der Viren auf Sf9-Zellen werden Spinnerkulturen (10° Sf9-Zellen) infiziert. 72 Stunden nach Infektion werden die Zellen durch Sedimentation gewonnen und mittels Ultraschall aufgeschlossen. Nach Abtrennung von Membranen durch Sedimentation erfolgt die Reinigung der Hüllpartikel

wahlweise durch Zentifugation im CsCl-Dichtegradienten oder durch Affinitätschromatografie. Hierbei finden S-spezifische monoklonale Antikörper Anwendung.

2. Expression und Reinigung von HMG1

Das Gen des Nichthistonproteins HMG1 der Ratte wird aus dem Vektor zur bakteriellen Expression pT7RNHMG1 [Bianchi, E., Gene, 104 (1991) 271-275] entnommen und in den Baculovirus-Transfervektor PVL941 kloniert. Rekombinante Baculoviren werden nach dem für HBV-Gene beschriebenen Verfahren erzeugt. Der Expressionsnachweis erfolgt durch Coomassiefärbung der Proteine nach SDS-Polyacrylamidgelelektrophorese.

Zur Reinigung von Ratten-HMG1 aus infizierten Sf9-Zellen wird ein Zelllysat durch Aufschluß mit Ultraschall erzeugt, Membranen durch Sedimentation abgetrennt und das Lysat mit 2% TCA gefällt. Der Überstand wird anschließend einer Azetonfällung im sauren Milieu unterzogen. Das entstehende Präzipitat wird gelöst und durch Ionenaustauschchromatographie über eine Mono Q-Säule im Kochsalzgradient fraktioniert. Die bei 1,7M NaCl eluierte Fraktion enthält elektrophoretisch reines HMG1.

3. Herstellung von DNA-HMG1-Komplexen

Nach Böttger et al. [Biochim. Biophys. Acta 950 (1988) 221-228] wird Plasmid-DNA der Form 3 sequenzunabhängig von HMG1 gebunden und kondensiert.

Die Bildung der DNA-Protein-Komplexe erfolgt durch schrittweise Zugabe eines zwanzigfachen Masseüberschusses an HMG1 zu einer DNA-Lösung von $50\mu g/ml$ in 150mM NaCl 10mM Tris/HCl bei pH 8,0. DNA-Bindung und Kondensation werden durch Gelretardation und Sedimentation im Sacharosegradienten nachgewiesen.

4. Bindung von DNA-HMG1-Komplexen an HBV-Partikel

HBV-Hüllproteine werden mittels Transglutaminase kovalent mit HMG1 vernetzt. In dieser Reaktion treten ϵ -Aminogruppen der Lysine im HMG-Molekül als Acyl-Akzeptor und γ -Karboxamidgruppen der Glutaminreste im HBV-L und S-Protein als Acyldonor auf.

Die Reaktion wird 1h bei 37°C in 150mM NaCl, 10mM CaCl₂ 20mM Tris/HCl pH 8,0 mit 0,5 Einheiten Meerschweinchen-Transglutaminase bei einem Masseverhältnis von HMG1: HBVL+S = 10:1 durchgeführt.

5. Infektion primärer humaner Hepatozyten mit dem Gentransfervektor

Eine konfluente Monolayerkultur humaner Hepatozyten wird 5 Tage nach Anlage für 12 Stunden mit dem Transfervektor infiziert. Das Plasmid pBAG [Proc. Natl. Acad. Sci. 84 (1987) 156-160], das das Gen der B-Galaktosidase aus *E.coli* unter Kontrolle eines retroviralen LTR enthält, wird in den Vektor verpackt. Der Nachweis des Gentransfers erfolgt 48 Stunden nach Infektion durch den in situ-Enzymtest für B-Galaktosidase.

Patentansprüche

1. Vektor für die gewebespezifische Gentherapie, gekennzeichnet dadurch, daß ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis B-Virus gekoppelt wird.

- 2. Vektor für die leberspezifische Gentherapie nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß ein therapeutisches Gen, das an einen Promoter gekoppelt ist, mit einer Polypeptidhülle verpackt und an Komponenten des Hepatitis B-Virus gekoppelt wird.
- 3. Vektor nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß als therapeutisches Gen die cDNA eines Gens verwendet wird, das bei der zu behandelnden Krankheit defekt ist.
- 4. Vektor nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet dadurch, daß als Promotor ein leberspezifischer Promoter, bevorzugt ein Promoter/Enhancer von Hepatitis B verwendet wird.
- 5. Vektor nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus einem chromosomalen Protein, vorzugsweise aus gereinigtem HMG1, besteht.
- 6. Vektor nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus core-Protein von von Hepatitis B besteht.
- 7. Vektor nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch, daß die Polypeptidhülle aus Polyaminosäuren eines Typs basischer Aminosäuren hergestellt wird.
- 8. Vektor nach Anspruch 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch, daß als gekoppelte Komponente partikuläres prä-S1/S-Protein des Hepatitis B-Virus eingesetzt wird.

9. Vektor nach Anspruch 1 bis 8, gekennzeichnet dadurch, daß als gekoppelte Komponente Liposomen mit gebundenem prä-S1-Peptid eingesetzt werden.

- 10. Verfahren zur Herstellung des Vektors nach Anspruch 1 bis 9, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung des verpackten Gens an die Komponente(n) des Hepatitis B-Virus chemisch, enzymatisch oder über Antikörper durchgeführt wird.
- 11. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit einem bifunktionellen Linker, 3bevorzugt SPDP, durchgeführt wird.
- 12. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit Transaminase durchgeführt wird.
- 13. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, gekennzeichnet dadurch, daß die Kopplung mit bispezifischen Antikörpern durchgeführt wird.
- 14. Verfahren zur Anwendung des Vektors nach Anspruch 1 bis 9, gekennzeichnet dadurch, daß der Vektor konfektioniert und einem Patienten über die Blutbahn, vorzugsweise über die Portalvene der Leber, verabreicht wird.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

		·	
A. CLASSI IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER C12N15/87 C07K14/02 C12N15/3 A61K47/48	6 C12N15/86	A61K48/00
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classification	on symbols)	
IPC 6	C12N CO7K A61K		·]
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in th	e fields searched
			·
		•	
Plestonic di	sta base consulted during the international search (name of data base	and, where practical, search ten	ns used)
Ficenom-	or our formand amm?		1
			1
			1
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Relevant to claim No.
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	levant passages	Ketevant w want 110.
Y	CELL,		1-7,
	vol.46, 1986, CAMBRIDGE, NA US		10-14
	pages 429 - 436	•	1
	NEURATH A. R. ET AL. 'Identificat	ion and	1
	chemical synthesis of a host cell	receptor .I	
	binding site on hepatitis B virus see the whole document	•	· ·
	266 THE AUDIE COCOMEC		
γ	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY.,		1-7,
'	vol.267, no.3, January 1992, BALT	IMORE, MD	10-14
	US		
	pages 1953 - 1961	•	
	KURODA S. ET AL. 'Hepatitis B vir	rus	
·	envelope L protein particles		
,	see the whole document		
l .		-/	
	* '	•	
			time in annex
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members	are listed in anima.
* Special ca	tegories of cited documents:	"T" later document published at	ter the international filing date
1 -	ent defining the general state of the art which is not	or priority date and not in	conflict with the application but sciple or theory underlying the
consid	kred to be of particular relevance	invention	-
E' earlier	document but published on or after the international date	"X" document of particular rele cannot be considered novel	or cannot be considered to
'L' docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	involve an inventive step w	then the document is taken alone
citatio	is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"Y" document of particular rele cannot be considered to in	volve an inventive step when the
	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	ments, such combination b	h one or more other such docu- icing obvious to a person skilled
P docum	ent published prior to the international filing date but	in the art. "&" document member of the s	
<u></u>	than the priority date claimed	Date of mailing of the inter	
Date of the	actual completion of the international search		
1,	Managham 1004	14-12	- 1994
	24 November 1994		
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
1	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		•
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tr. 31 651 epo nl, Far. (+31-70) 340-3016	Espen, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

		PCT/DE 94/01003
.(Continual	ion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
ategory •	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	
Y	VACCINE, vol.7, 1989, GUILDFORD GB pages 60 - 68 YOUN B. W. ET AL. 'Purification and characterization of pre-S-containing hepatitis B surface antigens produced in recombinant mammalian cell culture' see the whole document	1-7, 10-14
Y	DNA, vol.7, 1988 pages 417 - 422 PRICE P. M ET AL. 'Translational selection in the expression of the hepatitis B virus envelope proteins'	1-7, 10-14
Y	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, vol.950, 1988 pages 221 - 228 BÖTTGER M. ET AL. 'Condensation of vector DNA by the chromosomal protein HMG1 results in efficient transfection' cited in the application	1-7, 10-14
Y	ARCHIV FÜR GESCHWULSTFORSCHUNG, vol.60, 1990 pages 265 - 270 BÖTTGER M. ET AL. 'Transfection by DNA-nuclear protein HMG1 complexes: raising of efficiency and role of DNA topology'	1-7, 10-14
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol.267, no.16, 1992, BALTIMORE, MD US pages 11483 - 11489 WILSON J.M. ET AL. 'A novel mechanism for achieving transgene persistence in Vivo after somatic gene transfer into hepatocytes' see the whole document	1-7, 10-14
Y	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, vol.90, March 1993, WASHINGTON US pages 2122 - 2126 CHRISTIANO R. J. ET AL. 'Hepatic gene therapy: adenovirus enhancement of receptor-mediated gene delivery and expression in primary hepatocytes' see the whole document	1-7, 10-14
		·

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE 94/01003

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. 🗸	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: Remark: Although Claim 14 is directed to a method for treatment of the human or animal body, the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition.
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
٠	
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	rnational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
2 3	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report
	covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Akterzeichen PCT/DE 94/01003

A. KLASSU IPK 6	TZIER UNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C12N15/87 C07K14/02 C12N15/36 A61K47/48	C12N15/86	A61K48/00
	green de nak de nationalen Klassifi	kation und der IPK	
	rnationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifi		
B. RECHER	CHIERTE GEBIETE Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
IPK 6	C12N CU/K ABIK		
D - dbiert	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit	diese unter die recherchiert	en Gebiete fallen
Während der	internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name	der Datenbank und evu. v	\$. J. 1 or 11
C. ALS WI	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		Teile Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe d	er in Betracht kommenden	Telle .
Υ	CELL,		1-7, 10-14
	Bd.46, 1986, CAMBRIDGE, NA US Seiten 429 - 436 NEURATH A. R. ET AL. 'Identification chemical synthesis of a host cell to binding site on hepatitis B virus' siehe das ganze Dokument	on and receptor	1-7, 10-14
Y	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY., Bd.267, Nr.3, Januar 1992, BALTIMO US Seiten 1953 - 1961 KURODA S. ET AL. 'Hepatitis B viru envelope L protein particles'		1-7, 10-14
	siehe das ganze Dokument	' 	
X w	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	Siehe Anhang Paten	
* Besonde *A* Verd aber *E* älter Ann	re Kattgorien von angegetenen vier der Technik definiert, infentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, micht als besonders bedeutsam anzuseben ist es Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen neldedatum veröffentlicht worden ist neldedatum veröffentlicht wo	Anmeldung meht kollidi Anmeldung zugrundeliege Theorie angegeben ist X Veröffentlichung von bes kam allein aufgrund die	, die nach dem internationalen Anmeldedatum n veröffentlicht worden ist und mit der ert, sondern mur zum Vervrändnis des der nden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden sonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung ser Veröffentlichung nicht als neu oder auf beruhend betrachtet werden
sche and soll "O" Ver ein	einen zu lassen, oder durch und der der der der der der der der der de	werden, wenn die Veröffentlichungen dies diese Verbindung für ei &' Veröffentlichung, die M	sonderer Bedeuning, die desingstatien errischer Tätigkeit berühend betrachtet fentlichung mit einer oder mehreren anderen er Kategorie in Verbindung gebracht wird und nen Fachmann naheliegend ist itglied derselben Patentfamilie ist rnationalen Recherchenberichts
Datum o	les Abschlusses der internationalen Recherche		-12- 1994
	24. November 1994	Bevollmächtigter Bedie	nsteter
Name u	nd Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tz. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Espen, J	·

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 94/01003

- Comme	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	JE 94/01003
Lategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tei	le Betr. Anspruch Nr.
(VACCINE,	1-7,
	Bd.7, 1989, GUILDFORD GB Seiten 60 - 68	10-14
	YOUN B. W. ET AL. 'Purification and characterization of pre-S-containing	
	hepatitis B surface antigens produced in recombinant mammalian cell culture! siehe das ganze Dokument	
:	DNA.	1-7,
	Bd.7, 1988	10-14
	Seiten 417 - 422 PRICE P. M ET AL. 'Translational selection in the expression of the hepatitis B virus	
	envelope proteins¹ siehe das ganze Dokument	·
•	BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA, Bd.950, 1988	1-7, 10-14
•	Seiten 221 - 228 BÖTTGER M. ET AL. 'Condensation of vector DNA by the chromosomal protein HMG1	
	results in efficient transfection ¹ in der Anmeldung erwähnt	
	siehe das ganze Dokument	
	ARCHIV FUR GESCHWULSTFORSCHUNG, Bd.60, 1990 Seiten 265 - 270	1-7, 10-14
	BÖTTGER M. ET AL. 'Transfection by DNA-nuclear protein HMG1 complexes:	
	raising of efficiency and role of DNA topology'	
· · ·	JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY,	1-7,
	Bd.267, Nr.16, 1992, BALTIMORE, MD US Seiten 11483 - 11489 WILSON J.M. ET AL. 'A novel mechanism for	10-14
	achieving transgene persistence in Vivo after somatic gene transfer into	
	hepatocytes ¹ siehe das ganze Dokument	
•	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA.	1-7, 10-14
	Bd.90, März 1993, WASHINGTON US Seiten 2122 - 2126 CHRISTIANO R. J. ET AL. 'Hepatic gene	
	therapy: adenovirus enhancement of receptor-mediated gene delivery and	
	expression in primary hepatocytes' siehe das ganze Dokument	
	·	

1

Internationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE94/01003

E-1	ld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)
├	mäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
1.	Ansprüche Nr. weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich Bemerkung: Obwohl der Anspruch 14 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers bezieht, wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.
2.	Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, weil sie sich auf Teile der internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3.	Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
-	eld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
	ie internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält
1.	Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.
2	Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3	Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
	Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchen erchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:
	Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.